

NOTICE D'EMPLOI

ADTAB 112 mg comprimés à croquer pour chiens de plus de 2,5 kg à 5,5 kg

EAN / GTIN	5420036974239 / 05420036974239
Présentation	Boîte de 1 plaquette de 3 comprimés à croquer
Espèce cible	Chien de plus de 2,5 kg à 5,5 kg
Statut	Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance

À RETENIR

1 comprimé entier une fois par mois, administré pendant ou juste après le repas. Vérifier le poids du chien avant chaque traitement : ce dosage est réservé aux chiens de plus de 2,5 kg à 5,5 kg.

1. À QUOI SERT CE MÉDICAMENT ?

Traitement des infestations par les puces et les tiques chez le chien.

- Puces : Ctenocephalides felis et Ctenocephalides canis.
- Tiques : Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus et Dermacentor reticulatus.
- L'activité insecticide et acaricide est immédiate et persiste pendant 1 mois.

Les puces et les tiques doivent s'être attachées au chien et avoir commencé leur repas pour être exposées au lotilaner. Le risque de transmission d'une maladie par un parasite ne peut donc pas être totalement exclu.

2. COMPOSITION

Chaque comprimé contient 112,5 mg de lotilaner.

Excipients : cellulose en poudre, lactose monohydraté, cellulose microcristalline silicifiée, arôme de viande séchée, crospovidone, povidone K30, laurilsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre et stéarate de magnésium.

3. POSOLOGIE ET FRÉQUENCE

Poids du chien	Dose à administrer	Fréquence
Plus de 2,5 kg à 5,5 kg	1 comprimé entier ADTAB 112 mg	Une fois par mois

La dose recommandée est de 20 à 43 mg de lotilaner par kg de poids corporel. Pour éviter un sous-dosage et une perte d'efficacité, peser le chien aussi précisément que possible.

CHANGEMENT DE POIDS

Si le chien ne pèse plus entre 2,5 kg et 5,5 kg, utiliser le dosage correspondant à sa nouvelle tranche de poids ou demander conseil à un vétérinaire ou à un pharmacien.

4. MODE D'ADMINISTRATION

- 1. Sortir un comprimé de la plaquette au moment de l'administration.
- 2. Donner le comprimé à croquer pendant ou après le repas : la nourriture améliore l'absorption du lotilaner.
- 3. Vérifier que le chien a bien avalé la totalité du comprimé.
- 4. Renouveler tous les mois pendant toute la saison des puces et/ou des tiques, selon le risque local.

PROTECTION DU FOYER

Les puces peuvent se développer dans les couchages, tapis et tissus d'ameublement. En cas d'infestation importante, traiter l'environnement avec un produit adapté et aspirer régulièrement. Les autres animaux du foyer doivent aussi recevoir un traitement approprié si nécessaire.

5. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au lotilaner ou à l'un des excipients.
- L'innocuité et l'efficacité n'ont pas été évaluées chez les chiots de moins de 8 semaines ni chez les chiens de moins de 1,3 kg : demander l'avis d'un vétérinaire avant toute utilisation.
- Le comprimé est destiné au chien uniquement et doit être administré par voie orale.
- Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

6. PRÉCAUTIONS POUR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE PRODUIT

- Se laver les mains après manipulation du comprimé.
- En cas d'ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

7. GESTATION, LACTATION, REPRODUCTION ET INTERACTIONS

L'innocuité n'a pas été établie chez les chiennes gestantes ou allaitantes ni chez les chiens reproducteurs. Consulter un vétérinaire avant le traitement dans ces situations.

Aucune interaction médicamenteuse n'est connue. Lors des essais cliniques, aucune interaction n'a été observée avec des médicaments vétérinaires d'usage courant.

8. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Des effets indésirables ont été rapportés très rarement, c'est-à-dire chez moins de 1 animal sur 10 000, y compris les cas isolés :

- Diarrhée, parfois sanglante, et vomissements.
- Perte d'appétit, léthargie ou augmentation de la soif.
- Troubles neurologiques transitoires : démarche anormale (ataxie), tremblements ou convulsions.
- Démangeaisons.
- Mictions inappropriées, augmentation du volume des urines ou incontinence urinaire.

La plupart des effets décrits étaient légers et transitoires et disparaissaient généralement sans traitement. En cas de réaction importante, persistante ou neurologique, contacter rapidement un vétérinaire.

9. SURDOSAGE

Aucun effet indésirable n'a été observé dans une étude chez des chiots de 8 à 9 semaines traités à plusieurs reprises, à intervalles mensuels, avec jusqu'à 5 fois la dose maximale recommandée. Respecter néanmoins strictement le dosage adapté au poids du chien.

10. DURÉE D'ACTION

Parasite	Délai d'action	Durée
Puces	Puces déjà présentes tuées dans les 6 heures ; efficacité dans les 4 heures après nouvel attachement	1 mois
Tiques	Tiques Ixodes ricinus déjà présentes tuées dans les 8 heures ; efficacité dans les 48 heures après nouvel attachement	1 mois

11. CONSERVATION ET ÉLIMINATION

- Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.
- Conserver dans l'emballage d'origine et ne sortir le comprimé qu'au moment de l'administration.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.
- Ne pas jeter les comprimés inutilisés dans les égouts ou les ordures ménagères. Les rapporter dans un circuit de collecte approprié, notamment à la pharmacie.

12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Titulaire de l'AMM	ELANCO, Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Allemagne
Responsable en France	ELANCO FRANCE, Crisco Uno - Bâtiment C, 3-5 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres, France
N° d'AMM	EU/2/22/288/004
Première autorisation	13 septembre 2022
Date de mise à jour du RCP	31 mars 2023
Sources utilisées	RCP officiel ANMV/ANSES et fiche Med'Vet correspondant au GTIN 05420036974239

IMPORTANT

Cette fiche est une notice pratique destinée à faciliter l'utilisation. Elle ne remplace pas la notice réglementaire contenue dans l'emballage. Lire intégralement la notice officielle avant emploi et demander conseil à un vétérinaire ou à un pharmacien en cas de doute.