

DUOFLECT®

Solution pour spot-on pour chiens de 20 à 40 kg

Notice d'emploi simplifiée à destination du propriétaire de l'animal

À retenir avant toute application

Usage externe uniquement. Appliquer la totalité d'une pipette de 2,8 mL directement sur la peau sèche, entre les omoplates. Ne jamais utiliser chez le lapin. Ne pas employer chez un animal malade ou convalescent, ni chez un chiot de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

1. À quoi sert ce médicament ?

DUOFLECT contient du fipronil et du (S)-méthoprène. Il traite et prévient les infestations par les puces et les tiques chez le chien de 20 à 40 kg.

- Puces adultes (*Ctenocephalides* spp.) : efficacité insecticide immédiate et protection contre les nouvelles infestations pendant 9 semaines.
- Œufs et larves de puces : inhibition de leur développement pendant 8 semaines, afin de freiner la contamination de l'environnement.
- Tiques (*Dermacentor reticulatus* et *Rhipicephalus sanguineus*) : efficacité acaricide immédiate et persistante pendant 6 semaines.
- Le produit peut être intégré à la prise en charge de la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP), lorsque le diagnostic a été posé par un vétérinaire.

Important

La fixation de quelques tiques après le traitement reste possible. Le risque de transmission d'une maladie infectieuse ne peut donc pas être totalement exclu. En cas d'infestation importante, traiter également l'environnement et protéger tous les animaux du foyer avec des produits adaptés à leur espèce.

2. Dose et fréquence d'utilisation

Poids du chien	Dose à appliquer	Contenu de la pipette
20 à 40 kg	1 pipette entière	Fipronil 479 mg + (S)-méthoprène 240 mg

Renouvellement : le traitement peut être répété toutes les 6 semaines ou adapté au niveau d'exposition parasitaire. Ne pas renouveler à moins de 2 semaines d'intervalle.

Chien hors de la tranche 20 à 40 kg : utiliser la présentation correspondant à son poids sur conseil du vétérinaire ou du pharmacien ; ne pas multiplier les pipettes de cette présentation de votre propre initiative.

3. Comment appliquer DUOFLECT ?

1. Détacher une alvéole de la plaquette puis l'ouvrir avec des ciseaux en suivant la ligne prévue, sans couper la pipette.
2. Sortir la pipette, la tenir verticalement et tapoter légèrement afin de faire descendre le liquide dans le corps de la pipette.
3. Rompre l'embout au niveau du trait prédécoupé.
4. Écarter les poils entre les omoplates, près de la base du cou, jusqu'à rendre la peau visible.
5. Placer l'embout sur la peau et presser plusieurs fois pour vider entièrement la pipette en un seul point. Éviter de trop mouiller le pelage.

Après l'application

Empêcher les animaux de se lécher entre eux. Laisser sécher complètement la zone avant tout contact avec le mobilier ou les tissus. Ne pas manipuler ni laisser les enfants jouer avec le chien pendant au moins 12 heures ; une application le soir est recommandée. Le jour du traitement, ne pas laisser le chien dormir avec ses maîtres, surtout avec les enfants.

4. Quand ne pas utiliser ce médicament ?

- Chez le lapin : des effets indésirables parfois mortels peuvent survenir.
- Chez un animal malade, fébrile ou convalescent.
- En cas d'allergie connue au fipronil, au (S)-méthoprène ou à l'un des excipients.
- Chez un chiot de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.
- Sur une plaie, une peau lésée ou une zone humide.

5. Précautions particulières pour le chien

- Voie externe uniquement : ne pas faire avaler et éviter tout contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Appliquer sur une zone que le chien ne peut pas lécher et empêcher le léchage entre animaux récemment traités.
- Les bains ou shampooings hebdomadaires peuvent réduire la durée d'efficacité. Ne pas laisser le chien nager dans un cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application.

6. Précautions pour la personne qui applique le produit

- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et la bouche. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
- Se laver soigneusement les mains au savon et à l'eau après utilisation.
- Les personnes allergiques au fipronil ou au (S)-méthoprène ne doivent pas appliquer le produit.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin si l'irritation persiste.
- En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin avec la notice ou l'emballage.
- Conserver les pipettes dans leur emballage et jeter immédiatement la pipette vide hors de portée des enfants.

7. Gestation, allaitement et interactions

Gestation et allaitement : l'innocuité n'a pas été établie chez la chienne gestante ou allaitante. Utiliser uniquement après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Interactions : aucune interaction médicamenteuse connue.

8. Effets indésirables possibles

Les effets suivants ont été rapportés très rarement, c'est-à-dire chez moins de 1 animal sur 10 000, cas isolés compris :

- aspect humide ou poils ébouriffés au point d'application ;
- dépôts secs ou légères squames, généralement transitoires ;
- hypersalivation temporaire après léchage du produit ou vomissements après ingestion accidentelle.

Demandez rapidement conseil à un vétérinaire si un effet est important, persiste, s'aggrave ou si vous observez un signe non mentionné.

9. Surdosage ou ingestion accidentelle

Ne pas appliquer plus d'une pipette et ne pas renouveler trop tôt. En cas d'ingestion, de surdosage ou de réaction inhabituelle, contactez immédiatement un vétérinaire et conservez l'emballage.

Urgence vétérinaire

Consultez sans attendre en cas de tremblements, troubles de l'équilibre, abattement marqué, difficultés respiratoires, vomissements répétés, convulsions ou dégradation rapide de l'état général.

10. Conservation et élimination

- Aucune température particulière de conservation n'est requise ; conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants et ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Ne pas jeter dans les eaux usées, les cours d'eau ou la nature : le produit est dangereux pour les poissons et les organismes aquatiques.
- Rapporter les produits non utilisés et les emballages concernés dans le circuit de collecte approprié, selon les consignes du vétérinaire ou du pharmacien.

11. Composition et présentation

Substances actives par pipette de 2,8 mL : fipronil 479 mg et (S)-méthoprène 240 mg.

Excipients à effet notoire : butylhydroxyanisole (E320) 0,56 mg et butylhydroxytoluène (E321) 0,56 mg.

Autres excipients : éthanol anhydre et éther monoéthylique de diéthylèneglycol. Solution jaunâtre.

Présentation liée au GTIN : boîte de 3 pipettes unidoses de 2,8 mL.

12. Informations réglementaires

Titulaire de l'autorisation	CEVA Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, France
Numéro d'AMM	FR/V/4025938 3/2014
GTIN de la présentation liée	3411112264704
Conditionnement lié	Boîte de 3 plaquettes thermoformées de 1 pipette
Statut de délivrance	Médicament vétérinaire non soumis à prescription
Date de révision de la notice source	27 juin 2025

Sources et portée du document

Cette notice pratique est une synthèse établie à partir de Med'Vet et du RCP officiel de l'ANMV. Elle ne remplace pas la notice réglementaire présente dans la boîte ni les conseils du vétérinaire ou du pharmacien.

Fiche Med'Vet : [DUOFLECT solution pour spot-on pour chiens de 20 à 40 kg](#)

Information officielle : [ANMV - Résumé des caractéristiques du produit DUOFLECT](#)

Document préparé le 26 juillet 2026