

NOTICE D'EMPLOI

VECTRA 3D solution spot-on pour chiens de plus de 4 à 10 kg

EAN / GTIN	3411112079872 / 03411112079872
Présentation	Boîte de 3 applicateurs unidoses de 1,6 mL - bouchon vert
Espèce cible	Chien de plus de 4 kg à 10 kg
Statut	Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance

À RETENIR

1 applicateur entier de 1,6 mL par chien de plus de 4 à 10 kg, à appliquer directement sur une peau saine. La protection dure environ un mois et le traitement peut être renouvelé chaque mois. Ne jamais utiliser chez le chat : la perméthrine peut provoquer des troubles graves, parfois mortels.

1. À QUOI SERT CE MÉDICAMENT ?

Traitement et prévention des infestations par les puces et les tiques chez le chien, avec une action répulsive contre plusieurs insectes volants.

- Puces : Ctenocephalides felis et Ctenocephalides canis - traitement et prévention pendant un mois.
- Œufs et larves de puces : empêche la multiplication des puces pendant deux mois après l'application.
- Tiques : action acaricide et répulsive contre Rhipicephalus sanguineus et Ixodes ricinus pendant un mois, et contre Dermacentor reticulatus jusqu'à trois semaines.
- Phlébotomes : action répulsive contre Phlebotomus perniciosus pendant un mois.
- Moustiques : action répulsive contre Culex pipiens et Aedes aegypti pendant un mois ; action insecticide contre Aedes aegypti pendant un mois.
- Mouches d'étable : action répulsive et insecticide contre Stomoxys calcitrans pendant un mois.

2. COMPOSITION

Chaque applicateur de 1,6 mL contient :

Substance	Quantité par applicateur
Dinotéfurane	86,4 mg
Pyriproxifène	7,74 mg
Perméthrine	635,2 mg

Excipients principaux : N-octyl-2-pyrrolidone et N-méthylpyrrolidone. Solution jaune claire.

3. POSOLOGIE ET FRÉQUENCE

Poids du chien	Dose à administrer	Fréquence
Plus de 4 kg à 10 kg	1 applicateur vert entier de 1,6 mL	Une fois par mois selon le risque

La dose minimale recommandée correspond à 0,12 mL de solution par kg. Ne pas fractionner ni réutiliser un applicateur ouvert.

4. MODE D'ADMINISTRATION

- Retirer l'applicateur de l'emballage et le tenir verticalement, les doigts placés sous le grand disque.
- Avec l'autre main, appuyer sur le petit disque jusqu'à ce que les deux disques se rejoignent : le joint est alors percé.
- Placer le chien debout ou dans une position confortable. Écarter les poils jusqu'à voir la peau.
- Pour un chien de plus de 4 à 10 kg, appliquer lentement la totalité du contenu directement sur la peau, en deux points le long du dos, en commençant entre les omoplates. Une application en ligne continue de la base de la queue jusqu'aux omoplates est également possible.
- Éviter de déposer le produit uniquement sur les poils. Appliquer exclusivement sur une peau saine, non lésée.

APRÈS L'APPLICATION

Laisser sécher complètement le point d'application. Tenir le chien traité à l'écart des chats jusqu'au séchage complet. Ne pas laisser les enfants toucher le chien pendant au moins 4 heures. Il est conseillé d'appliquer le produit le soir ou avant une promenade.

5. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS CHEZ L'ANIMAL

- Ne pas utiliser chez le chat. En cas d'exposition accidentelle, laver rapidement le chat avec un shampoing ou du savon et contacter un vétérinaire si des symptômes apparaissent.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'une des substances actives ou à un excipient.
- L'innocuité n'a pas été établie chez les chiots de moins de 7 semaines ou pesant moins de 1,5 kg.
- Éviter tout contact avec les yeux du chien. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau.
- Quelques tiques peuvent rester fixées après le traitement ; le risque de transmission d'une maladie ne peut donc pas être totalement exclu.
- Les bains répétés chaque semaine à partir de 48 heures après l'application et un shampoing deux semaines après le traitement n'ont pas réduit l'efficacité dans les études. En revanche, les bains ou shampoings dans les 48 heures peuvent diminuer la durée d'action.
- En cas d'infestation importante par les puces, traiter également l'environnement de l'animal avec un produit adapté et aspirer régulièrement les couchages, tapis et canapés.

6. PRÉCAUTIONS POUR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE PRODUIT

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application. Se laver soigneusement les mains immédiatement après usage.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact cutané, laver à l'eau et au savon ; en cas de projection oculaire, rincer abondamment à l'eau.
- Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être ne doivent pas administrer le produit et doivent éviter tout contact direct avec le site d'application jusqu'à son séchage complet.
- Le jour du traitement, ne pas laisser le chien dormir avec son propriétaire, en particulier avec des enfants.
- Jeter immédiatement l'applicateur vide et le maintenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion accidentelle ou d'irritation persistante, consulter rapidement un médecin et lui montrer l'étiquette ou la notice.

7. GESTATION, LACTATION ET INTERACTIONS

L'innocuité n'a pas été établie chez les chiennes gestantes, allaitantes ou destinées à la reproduction. L'utilisation doit être décidée par un vétérinaire après évaluation du bénéfice et du risque.

Aucune interaction médicamenteuse connue.

8. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- Rarement : rougeur, démangeaisons ou gêne au point d'application, généralement légères et transitoires.
- Rarement : hyperactivité, anxiété, vocalisations, léthargie, perte d'appétit ou tremblements musculaires.
- Très rarement : perte d'équilibre, vomissements, diarrhée, aspect humide ou poils ébouriffés au point d'application.
- Des cas isolés de convulsions ont été rapportés. Si un effet indésirable est important, persiste ou s'aggrave, contacter rapidement un vétérinaire.

9. SURDOSAGE ET INGESTION ACCIDENTELLE

Chez des chiots sains âgés de 7 semaines, des administrations répétées jusqu'à 5 fois la dose maximale recommandée n'ont entraîné, en dehors d'une rougeur et de modifications transitoires du pelage au point d'application, aucun autre effet indésirable.

Après ingestion accidentelle de la dose maximale recommandée, des vomissements, une salivation ou une diarrhée peuvent survenir ; ces signes disparaissent généralement sans traitement. Demander néanmoins conseil à un vétérinaire.

10. DURÉE D'ACTION

Parasite / action	Durée indicative après une application
Puces adultes	1 mois
Œufs et développement larvaire des puces	2 mois
Rhipicephalus sanguineus et Ixodes ricinus	1 mois
Dermacentor reticulatus	Jusqu'à 3 semaines
Phlébotomes, moustiques et mouches d'étable - action répulsive	1 mois
Aedes aegypti et Stomoxys calcitrans - action insecticide	1 mois

11. CONSERVATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Conserver dans l'emballage d'origine et ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte.
- Durée de conservation du produit conditionné pour la vente : 3 ans.
- Ne pas laisser le chien entrer dans un cours d'eau ou un milieu aquatique pendant au moins 48 heures après le traitement.
- Ne pas déverser le produit dans les éviers, toilettes, étangs, fossés ou cours d'eau : il est dangereux pour les poissons et les autres organismes aquatiques.
- Éliminer les applicateurs et les produits inutilisés selon les exigences locales, par un circuit de collecte adapté.

12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Titulaire de l'AMM	CEVA Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, France
N° d'AMM	EU/2/13/156
Présentation concernée	Boîte de 3 applicateurs de 1,6 mL - EU/2/13/156/007
Première autorisation	4 décembre 2013
Sources utilisées	RCP officiel ANMV/ANSES et fiche Med'Vet de VECTRA 3D pour chiens de plus de 4 à 10 kg

IMPORTANT

Cette fiche est une notice pratique destinée à faciliter l'utilisation. Elle ne remplace pas la notice réglementaire contenue dans l'emballage. Lire intégralement la notice officielle avant emploi et demander conseil à un vétérinaire ou à un pharmacien en cas de doute.