

NOTICE D'EMPLOI

FLUMECTO BIOCANINA 1,25 g + 0,56 g collier médicamenteux pour chats

EAN / GTIN	3661729027791
Présentation	Boîte de 1 sachet contenant 1 collier gris de 38 cm (12,5 g)
Espèce cible	Chat
Statut	Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance

À RETENIR

Un collier par chat, porté sans interruption. Laisser environ 2 doigts entre le collier et le cou, puis couper l'excédent en laissant au maximum 2 cm. Ne pas utiliser chez un chaton de moins de 10 semaines. Ce médicament est indiqué lorsque la protection contre les puces et les tiques est nécessaire simultanément.

1. À QUOI SERT CE MÉDICAMENT ?

Chez les chats infestés ou exposés simultanément aux puces et aux tiques :

- Puces - Ctenocephalides felis : traitement et prévention des réinfestations pendant 5,5 mois.
- Environnement : protection contre le développement des larves de puces pendant 10 semaines.
- Tiques - Ixodes ricinus : effet acaricide et répulsif jusqu'à 8 mois.
- Efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes.

Le collier peut être intégré dans un programme de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, après avis vétérinaire.

2. COMPOSITION

Substance	Quantité par collier
Imidaclopride	1,25 g
Fluméthrine	0,56 g

Excipients principaux : chlorure de polyvinyle, adipate de dibutyle, huile de soja époxydée, acide stéarique, dioxyde de titane (E171) et oxyde de fer noir (E172).

3. POSOLOGIE ET DURÉE

Animal	Dose	Durée de port
Chat	1 collier de 38 cm	En continu pendant la période de protection ; retirer après la période de traitement

Idéalement, poser le collier avant le début de la saison des puces et des tiques. Au-delà de 5,5 mois, l'efficacité contre les puces devient insuffisante.

4. MODE DE MISE EN PLACE

- Sortir le collier du sachet uniquement au moment de l'utilisation.
- Dérouler le collier et vérifier qu'aucun morceau de languette plastique ne reste à l'intérieur.
- Placer le collier autour du cou sans trop le serrer : laisser environ 2 doigts entre le collier et le cou.
- Passer l'extrémité dans la boucle et couper l'excédent en laissant au maximum 2 cm.
- Vérifier régulièrement l'ajustement, surtout chez les jeunes chats en croissance.
- Laisser le collier en place sans interruption pendant la période de protection, puis le retirer.

MÉCANISME DE SÉCURITÉ

Le collier possède un système de fermeture sécurisé. Si le chat reste accroché, il devrait normalement pouvoir élargir le collier et se dégager.

5. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS CHEZ LE CHAT

- Ne pas utiliser chez les chatons de moins de 10 semaines.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'imidaclopride, à la fluméthrine ou à un excipient.
- Retirer les tiques déjà présentes avant la pose. La protection contre les nouvelles tiques commence dans les 2 jours.
- Une tique peut encore se fixer : le risque de transmission d'une maladie ne peut jamais être totalement exclu.
- Le collier résiste à l'eau, mais éviter les shampooings et les expositions longues ou répétées à l'eau.
- En cas de forte infestation de puces, aspirer les couchages, tapis et canapés et traiter l'environnement avec un produit approprié.
- Traiter si nécessaire les autres animaux du foyer avec un produit adapté à leur espèce.

Important : en l'absence de risque simultané de puces et de tiques, préférer un produit antiparasitaire à spectre plus étroit.

6. PRÉCAUTIONS POUR LA PERSONNE QUI POSE LE COLLIER

- Conserver le collier dans son sachet et sa boîte jusqu'à l'utilisation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier ou le mettre dans la bouche. Éliminer immédiatement les morceaux coupés.
- Éviter tout contact prolongé avec le collier ou le cou de l'animal traité, en particulier chez les femmes enceintes.
- Le chat portant le collier ne doit pas dormir dans le même lit que son propriétaire, surtout s'il s'agit d'un enfant.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains à l'eau froide après la pose.
- En cas d'ingestion ou d'exposition orale, contacter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou la notice.

7. GESTATION, LACTATION ET INTERACTIONS

L'utilisation n'est pas recommandée chez la chatte gestante ou allaitante. Aucune interaction médicamenteuse n'est connue.

8. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Retirer le collier et demander conseil à un vétérinaire si les signes sont importants, persistants ou inhabituels.

- Peu fréquents : rougeur, perte de poils ou démangeaisons au niveau du cou. Ces signes disparaissent généralement en 1 à 2 semaines.
- Rares : dermatite, eczéma, inflammation ou lésion locale ; léchage ou toilettage excessif, tendance à se cacher, hyperactivité ou vocalisations ; diarrhée, hypersalivation, vomissements, baisse d'appétit ou abattement.
- Très rares : agressivité. Vérifier que le collier n'est pas trop serré.
- Fréquence indéterminée : dermatite de contact chez les animaux hypersensibles.

9. EN CAS D'INGESTION

Le surdosage est peu probable. Si le chat avale une partie du collier, de légers troubles digestifs, notamment des selles molles, peuvent survenir. Contactez un vétérinaire et conservez l'emballage.

10. CONSERVATION

- Conserver dans l'emballage d'origine, le sachet fermé dans la boîte jusqu'à l'utilisation.
- Aucune condition particulière de température n'est requise.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

11. ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

- Ne pas jeter le collier, les chutes ou le médicament inutilisé dans les toilettes, les éviers, les cours d'eau ou les ordures ménagères.
- Utiliser un dispositif de collecte approprié selon les règles locales.
- L'imidaclopride et la fluméthrine peuvent être dangereux pour les poissons et les organismes aquatiques ; l'imidaclopride est également toxique pour les abeilles.

12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom complet	FLUMECTO BIOCANINA 1,25 g + 0,56 g collier médicamenteux pour chats
Titulaire de l'AMM	BEAPHAR B.V.
N° d'AMM	FR/V/2386416 0/2025
Date de première AMM	14 janvier 2026
RCP utilisé	Mise à jour du 29 avril 2026

QUAND DEMANDER CONSEIL ?

Consulter rapidement un vétérinaire en cas de réaction cutanée importante, de vomissements répétés, d'hypersalivation persistante, d'abattement marqué, de comportement inhabituel ou si une partie du collier a été avalée.

Source : Résumé des caractéristiques du produit publié par l'ANMV/Anses. La notice officielle fournie dans la boîte et les conseils du vétérinaire ou du pharmacien restent prioritaires.