

NOTICE D'EMPLOI

FLUMECTO BIOCANINA 4,50 g + 2,03 g collier médicamenteux pour chiens de plus de 8 kg

EAN / GTIN	3661729027814
Présentation	Boîte de 1 sachet contenant 1 collier gris de 70 cm (45 g)
Espèce cible	Chien pesant plus de 8 kg
Statut	Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance

À RETENIR

Un collier par chien, porté sans interruption. Laisser environ 2 doigts entre le collier et le cou, puis couper l'excédent en laissant au maximum 2 cm. Ne pas utiliser chez un chiot de moins de 7 semaines. La durée d'action varie selon le parasite : 6 mois contre les puces et jusqu'à 8 mois contre les tiques et le risque lié aux phlébotomes.

1. À QUOI SERT CE MÉDICAMENT ?

Chez les chiens infestés ou exposés simultanément aux tiques, aux puces et/ou aux phlébotomes. Le collier est indiqué lorsqu'une protection combinée est nécessaire.

- Puces - *Ctenocephalides canis* et *Ctenocephalides felis* : traitement et prévention des réinfestations pendant 6 mois.
- Environnement : protection contre le développement des larves de puces pendant 3 mois.
- Tiques - *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus* et *Rhipicephalus sanguineus* : activité acaricide et/ou répulsive jusqu'à 8 mois. Le délai d'installation de la protection varie selon l'espèce de tique.
- Phlébotomes : réduction du risque d'infection par *Leishmania infantum* pendant 8 mois. Le risque de transmission ne peut toutefois pas être totalement exclu.

Le collier peut être intégré dans un programme de contrôle de la dermatite allergique aux piqûres de puces, après avis vétérinaire.

2. COMPOSITION

Substance	Quantité par collier
Imidaclopride	4,50 g
Fluméthrine	2,03 g

Excipients principaux : chlorure de polyvinyle, adipate de dibutyle, huile de soja époxydée, acide stéarique, dioxyde de titane (E171) et oxyde de fer noir (E172).

3. POSOLOGIE ET DURÉE

Animal	Dose	Durée de port
Chien de plus de 8 kg	1 collier de 70 cm	En continu pendant la période de protection ; retirer après la période de traitement

Idéalement, poser le collier avant le début de la saison des puces, des tiques ou des phlébotomes. Au-delà de 6 mois, l'efficacité contre les puces devient insuffisante.

4. MODE DE MISE EN PLACE

- Sortir le collier du sachet uniquement au moment de l'utilisation.
- Dérouler le collier et vérifier qu'aucun morceau de languette plastique ne reste à l'intérieur.
- Placer le collier autour du cou sans trop le serrer : laisser environ 2 doigts entre le collier et le cou.
- Passer l'extrémité dans la boucle et couper l'excédent en laissant au maximum 2 cm.
- Vérifier régulièrement l'ajustement, surtout chez les jeunes chiens en croissance.
- Laisser le collier en place sans interruption pendant la période de protection, puis le retirer.

MÉCANISME DE SÉCURITÉ

Le collier possède un système de fermeture sécurisé. Dans le très rare cas où le chien resterait accroché, il devrait normalement pouvoir élargir le collier et se dégager.

5. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS CHEZ LE CHIEN

- Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'imidaclopride, à la fluméthrine ou à un excipient.
- Retirer les tiques déjà présentes avant la pose. La prévention des nouvelles infestations commence généralement dans les 2 jours, mais le délai varie selon l'espèce de tique.
- Une tique peut encore se fixer : le risque de transmission d'une maladie ne peut jamais être totalement exclu.
- Le collier résiste à l'eau, mais éviter les shampooings fréquents et les expositions longues ou répétées à l'eau, qui peuvent réduire sa durée d'action.
- Pour une protection contre les phlébotomes, poser le collier avant leur saison d'activité et le laisser en continu pendant toute la période à risque.
- En cas de forte infestation de puces, aspirer les couchages, tapis et canapés et traiter l'environnement avec un produit approprié.
- Traiter si nécessaire les autres animaux du foyer avec un produit adapté à leur espèce.

Important : en l'absence de risque simultané de puces, de tiques et/ou de phlébotomes, préférer un antiparasitaire à spectre plus étroit.

6. PRÉCAUTIONS POUR LA PERSONNE QUI POSE LE COLLIER

- Conserver le collier dans son sachet et sa boîte jusqu'à l'utilisation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier ou le mettre dans la bouche. Éliminer immédiatement les morceaux coupés.
- Éviter tout contact prolongé avec le collier ou le cou de l'animal traité, en particulier chez les femmes enceintes.
- Le chien portant le collier ne doit pas dormir dans le même lit que son propriétaire, surtout s'il s'agit d'un enfant.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains à l'eau froide après la pose.
- En cas d'ingestion ou d'exposition orale, contacter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou la notice.

7. GESTATION, LACTATION ET INTERACTIONS

L'utilisation n'est pas recommandée chez la chienne gestante ou allaitante. Aucune interaction médicamenteuse n'est connue.

8. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Retirer le collier et demander conseil à un vétérinaire si les signes sont importants, persistants ou inhabituels.

- Rares : rougeur, perte de poils, démangeaisons ou grattage au niveau du cou ; mastication, léchage ou toilettage excessifs, tendance à se cacher, hyperactivité ou vocalisations ; diarrhée, hypersalivation, vomissements, baisse d'appétit ou abattement ; troubles neurologiques tels qu'ataxie, tremblements ou convulsions.

- Très rares : dermatite, eczéma, saignement, inflammation ou lésion au site de contact ; agressivité.

Les réactions locales simples disparaissent généralement en 1 à 2 semaines. En cas de symptômes neurologiques ou de lésion importante, retirer le collier et contacter rapidement un vétérinaire.

9. EN CAS D'INGESTION

Le surdosage est peu probable. Si le chien avale une partie du collier, de légers troubles digestifs, notamment des selles molles, peuvent survenir. Contactez un vétérinaire et conservez l'emballage.

10. CONSERVATION

- Conserver dans l'emballage d'origine, le sachet fermé dans la boîte jusqu'à l'utilisation.
- Aucune condition particulière de température n'est requise.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

11. ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

- Ne pas jeter le collier, les chutes ou le médicament inutilisé dans les toilettes, les éviers, les cours d'eau ou les ordures ménagères.
- Utiliser un dispositif de collecte approprié selon les règles locales.
- L'imidaclopride et la fluméthrine peuvent être dangereux pour les poissons et les organismes aquatiques ; empêcher les chiens portant le collier de se baigner dans les cours d'eau.
- L'imidaclopride est également toxique pour les abeilles.

12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom complet	FLUMECTO BIOCANINA 4,50 g + 2,03 g collier médicamenteux pour chiens de plus de 8 kg
Titulaire de l'AMM	BEAPHAR B.V.
N° d'AMM	FR/V/3537066 4/2025
Date de première AMM	14 janvier 2026
RCP utilisé	Mis à jour le 29 avril 2026

QUAND DEMANDER CONSEIL ?

Consulter rapidement un vétérinaire en cas de réaction cutanée importante, de vomissements répétés, d'hypersalivation persistante, d'abattement marqué, de tremblements, de convulsions, de comportement inhabituel ou si une partie du collier a été avalée.

Source : Résumé des caractéristiques du produit publié par l'ANMV/Anses. La notice officielle fournie dans la boîte et les conseils du vétérinaire ou du pharmacien restent prioritaires.