

NOTICE D'EMPLOI

FLUBENOL Pâte orale pour chiens et chats

EAN / GTIN	5420036921882 / 05420036921882
Présentation	Boîte de 1 applicateur gradué contenant 7,5 mL de pâte orale
Espèces cibles	Chien et chat
Statut	Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance pour cette présentation

À RETENIR

Dose quotidienne : 1 mL de pâte pour 2 kg de poids corporel. Durée : 2 jours pour les ascaris ou les ankylostomes ; 3 jours consécutifs pour les autres vers ciblés. La pâte peut être déposée directement dans la gueule ou mélangée à la nourriture.

1. À QUOI SERT CE MÉDICAMENT ?

FLUBENOL est un vermifuge à base de flubendazole destiné au traitement de certaines infestations digestives par des vers sensibles chez le chien et le chat.

Il agit notamment contre des ascaris, des ankylostomes, le trichure du chien et certains ténias.

2. COMPOSITION

Composant	Quantité
Flubendazole	44 mg par mL
Parahydroxybenzoate de méthyle (E218)	1,8 mg par mL
Parahydroxybenzoate de propyle	0,2 mg par mL
Autres composants	Glycérol, carbomères, hydroxyde de sodium, eau purifiée

Aspect : pâte orale inodore, de couleur blanche à crème.

3. POSOLOGIE ET DURÉE DU TRAITEMENT

Poids de l'animal	Dose par jour	Durée
2 kg	1 mL	2 ou 3 jours selon le parasite
4 kg	2 mL	2 ou 3 jours selon le parasite
5 kg	2,5 mL	2 ou 3 jours selon le parasite
10 kg	5 mL	2 ou 3 jours selon le parasite

Règle générale : 22 mg de flubendazole par kg et par jour, soit 1 mL de pâte par 2 kg de poids corporel et par jour.

Traiter pendant 2 jours lors d'infestations par des ascaris ou des ankylostomes. Traiter pendant 3 jours consécutifs pour les autres helminthes ciblés.

4. MODE D'ADMINISTRATION

1. Peser l'animal aussi précisément que possible.
 2. Tenir l'applicateur au niveau du piston. Tourner la bague de dosage jusqu'à ce que son bord supérieur corresponde au repère du poids de l'animal en kilogrammes.
 3. Retirer le capuchon, placer l'embout dans la gueule puis appuyer sur le piston jusqu'à l'arrêt.
 4. Pour les jours suivants, ajouter à chaque fois le poids de l'animal sur la graduation. Exemple : pour un chat de 5 kg traité pendant 3 jours, régler successivement la bague sur 5 kg, puis 10 kg, puis 15 kg.
- La dose peut aussi être mélangée à la nourriture, notamment chez un animal difficile à immobiliser. Vérifier que toute la portion contenant le médicament est consommée.

IMPORTANT POUR LE DOSAGE

La graduation de l'applicateur est cumulative d'un jour à l'autre. Ne remettez pas systématiquement la bague à zéro entre deux administrations du même traitement.

5. PARASITES CIBLÉS

Groupe	Parasites mentionnés dans le RCP
Ascaris	Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina
Ankylostomes	Uncinaria stenocephala, Ankylostoma caninum, Ankylostoma tubaeforme
Trichure	Trichuris vulpis
Ténias	Taenia pisiformis, Hydatigera taeniaeformis, Taenia hydatigena

6. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

Aucune contre-indication particulière n'est connue selon le RCP.

Respecter strictement la dose et la durée du traitement. Demander conseil à un vétérinaire en cas de doute sur le type de vers, de symptômes persistants ou de réinfestation fréquente.

Se laver les mains après administration.

7. GESTATION, LACTATION ET INTERACTIONS

Le médicament peut être utilisé au cours de la gestation et de la lactation. Son innocuité chez les femelles gestantes ou allaitantes a été établie.

Aucune interaction médicamenteuse connue n'est mentionnée dans le RCP.

8. EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rarement, une diarrhée modérée ou des vomissements transitoires peuvent survenir.

En cas de réaction importante, persistante ou inhabituelle, interrompre l'administration et demander rapidement conseil à un vétérinaire.

9. SURDOSAGE ET OUBLI D'UNE DOSE

Aucun effet indésirable n'a été observé dans les études après administration de doses allant jusqu'à cinq fois la dose recommandée.

Ne doublez pas une dose pour compenser une administration oubliée. Demandez conseil à un vétérinaire ou à un pharmacien afin de reprendre correctement le schéma prévu.

10. CONSERVATION

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage.

Durée de conservation du produit conditionné pour la vente : 30 mois.

11. ÉLIMINATION

Ne pas jeter le médicament dans les égouts ni avec les ordures ménagères.

Rapporter l'applicateur restant ou inutilisé à un dispositif de collecte adapté, conformément aux règles locales.

12. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Titulaire de l'AMM	ELANCO, Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, Allemagne
Responsable en France	ELANCO FRANCE, Crisco Uno - Bâtiment C, 3-5 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres
N° d'AMM	FR/V/1709197 6/1991
Présentation concernée	Boîte de 1 applicateur gradué de 7,5 mL - GTIN 05420036921882
Première autorisation	1er août 1991
Mise à jour du RCP	16 avril 2025
Sources utilisées	RCP officiel ANMV/ANSES et fiche MedVet FLUBENOL Pâte

IMPORTANT

Cette fiche est une notice pratique destinée à faciliter l'utilisation du produit. Elle ne remplace pas la notice réglementaire fournie dans l'emballage. Lire intégralement la notice officielle avant emploi et demander conseil à un vétérinaire ou à un pharmacien en cas de doute.